

臨床検査基準範囲の変更履歴

| 変更日 | 項目 | 新 | 旧 | 備考 |
|------------------------|------------------|----------------------------------|---|--|
| 2020.7.13 | ALP | 38~113U/L | 106~322U/L | 測定方法変更(JSSC法からIFCC法へ変更) 2020年7月13日夜間休日受付分から |
| 2020.9.2 | HCG(血清) | M: <1.0 mIU/mL F: ≤5.0 mIU/mL | <0.5 mIU/mL | 測定機器、測定方法および試薬変更のため 2020年9月2日夜間休日受付分から |
| | HCG(尿) | ≤3.0 mIU/mL | | |
| 2020.9.3 | β-HCG(血清) | M: <2.0 mIU/mL | <0.5 mIU/mL | 測定機器、測定方法および試薬変更のため |
| | | F: ≤1.0 mIU/mL | | |
| 2020.11.25 | LH | M: 2.2~8.4 mIU/mL | M: 0.52~7.8 mIU/mL | 測定機器、測定方法および試薬変更のため |
| | | F: 卵泡期: 1.4~15.0 mIU/mL | F: 卵泡期: 1.1~12.1 mIU/mL | |
| | | F: 排卵期: 8.0~100.0 mIU/mL | F: 排卵期: 2.0~39.7 mIU/mL | |
| | | F: 黄体期: 0.5~15.0 mIU/mL | F: 黄体期: 0.7~21.6 mIU/mL | |
| | | F: 閉経期: 11.0~50.0 mIU/mL | F: 閉経期: 8.4~67.7 mIU/mL | |
| | FSH | M: 1.8~12.0 mIU/mL | M: 1.3~17.0 mIU/mL | 測定機器、測定方法および試薬変更のため |
| | | F: 卵泡期: 3.0~10.0 mIU/mL | F: 卵泡期: 2.6~11.9 mIU/mL | |
| | | F: 排卵期: 5.0~24.0 mIU/mL | F: 排卵期: 2.8~15.6 mIU/mL | |
| | | F: 黄体期: 1.3~6.2 mIU/mL | F: 黄体期: 1.4~9.6 mIU/mL | |
| | PRL | M: 4.3~13.7 ng/mL | M: 3.0~17.3 ng/mL | 測定機器、測定方法および試薬変更のため |
| F: 閉経前: 4.9~29.3 ng/mL | | F: 1.6~21.9 ng/mL | | |
| F: 閉経後: 3.1~15.4 ng/mL | | | | |
| 2021.1.26 | PT-INR | 0.92~1.17 | 0.92~1.16 | ロット変更(2021.1.26~) |
| | PT-sec | 9.7~12.3 | 10.2~12.5 | |
| 2021.3.1 | インスリン | 1.2~9.0 μIU/mL | 2.1~19.0 μIU/mL | 測定機器、測定方法および試薬変更のため |
| | C-ペプチド(血液) | 0.67~2.48 ng/mL | 0.74~3.18 ng/mL | |
| | C-ペプチド(尿) | 40.1~86.1 μg/day | 18.3~124.4 μg/day | |
| | テストステロン(男性) | 1.87~9.02 ng/mL | 242.0~972.0 ng/dL | |
| | テストステロン(女性) | 0.50 ng/mL以下 | 10.0~75.0 ng/dL | |
| | TgAb | 19.3 IU/mL未満 | 5.0 IU/mL未満 | |
| | TPOAb | 3.3 IU/mL未満 | 3.0 IU/mL未満 | |
| | サイログロブリン | 3.71~35.12 ng/mL | 33.70 ng/mL以下 | |
| 2021/5/17 | 好中球数 | 1500~7500 / μL | 1800~7500 / μL | 臨床検査法提要在第34版から第35版へ 改訂されたため |
| | 好塩基球数 | 50 / μL未満 | 200 / μL未満 | |
| 2021/7/26 | PT-INR | 0.91~1.17 | 0.92~1.17 | ロット変更(2021.7.26~) |
| | PT-sec | 9.8~12.4 | 9.7~12.3 | |
| 2021/12/22 | サイトメガロウイルスIgG | SRLの総合検査案内をご確認ください | 4 U/mL未満: 陰性 4~6 U/mL未満: 判定保留 6 U/mL以上: 陽性 | 院内測定中止、SRLへ外注移行 |
| | サイトメガロウイルスIgM | | 0.70 TV未満: 陰性 0.70~0.90 TV未満: 判定保留 0.90 TV以上: 陽性 | |
| | 風疹ウイルスIgG | | 10 IU/mL未満: 陰性 10~15 IU/mL未満: 判定保留 15 IU/mL以上: 陽性 | |
| | 風疹ウイルスIgM | | 0.80 TV未満: 陰性 0.80~1.20 TV未満: 判定保留 1.20 TV以上: 陽性 | |
| | ムンプスウイルスIgG | | 0.35 TV未満: 陰性 0.35~0.50 TV未満: 判定保留 0.50 TV以上: 陽性 | |
| | 麻疹ウイルスIgG | | 0.50 TV未満: 陰性 0.50~0.70 TV未満: 判定保留 0.70 TV以上: 陽性 | |
| 2022/1/13 | PT-INR | 0.92~1.19 | 0.91~1.17 | ロット変更(2021/1/13~) |
| | PT-sec | 9.6~12.3 | 9.8~12.4 | |
| 2022/2/10 | T-Ly | 58~84 % | 59~88 % | スタンダードフローサイトメトリー 第2版 日本サイトメトリー技術者認定協議会編より引用 |
| | B-Ly | 5~24 % | 4~26 % | |
| | NK | 10~38 % | 2~26 % | |
| | CD3+4+ | 25~56 % | 29~65 % | |
| | CD3+8+ | 17~44 % | 13~40 % | |
| | CD4/CD8 | 0.6~2.9 | 0.6~2.9 | |
| 2022/3/23 | SCC抗原(扁平上皮癌関連抗原) | 0.24 ~ 2.52 ng/mL | 1.5 ng/mL以下 | 測定機器、測定原理および試薬変更のため |
| 2022/4/12 | IgG4 | 14.6~117.0 mg/dL | 4.5~117.0 mg/dL | 測定下限値変更のため |